

Broedvogelonderzoek "Stevensbergen"



Vogelwerkgroep
I.V.N. Bergeijk/Eersel
Regio Brabant zuid-oost

OKTOBER 2009

Inhoud

- 1. Werkwijze**
 - 1.1 Bezoekdata en werkwijze**
- 2. Gebiedsbeschrijving**
 - 2.1 Ligging**
 - 2.2 Vegetatie**
- 3. Territoria**
 - 3.1 Aantal vastgestelde territoria**
- 4. Conclusie**
 - 4.1 Vogeldichtheden**
 - 4.2 Samenvatting**

Broedvogelonderzoek "Stevensbergen"

Het onderzochte gebied is de afgelopen 5 jaar alleen op zeldzame soorten onderzocht.

Aan dit onderzoek hebben de navolgende personen hun medewerking verleend.

- Paul Brom
- Wout Couwenberg
- Ben Geraerts
- Fred van Hoof
- Hans van Nunen
- Koos Slenders
- Frans Tops

1. Werkwijze

Voor de kartering is de B.M.P. methode gebruikt. Dit is een uitgebreide territoriumkartering volgens de handleiding: SOVON BROEDVOGEL MONITORING PROJECT (uitgave 2004).

Als belangrijkste territorium indicerende waarneming kunnen zang en balts worden genoemd.

De inventarisatie is te voet met twee of meer personen uitgevoerd. Het is een redelijk goed te belopen wandelgebied dat op wegen en paden voor iedereen toegankelijk is. Er is een avond bezoek geweest voor het karteren van de bosuil en een voor het karteren van de Nachtzwaluw met als hulpmiddel een cd. speler.

1.1 Bezoekdata en tijden

1.	29 jan.	19.30 u – 20.30 u	(bosuil)
2.	21 mrt.	08.45 u – 09.45 u	
3.	15 apr.	07.30 u – 08.30 u	
4.	24 apr.	07.00 u – 08.00 u	
5.	15 mei	06.30 u – 07.30 u	
6.	29 mei	06.00 u – 07.00 u	
7.	12 juni	06.30 u – 07.30 u	
8.	16 juni	22.15 u – 23.15 u	(nachtzwaluw)

Namens de Vogelwerkgroep van het I.V.N. Bergeijk/ Eersel.

Oktober 2009.

2 Gebiedsbeschrijving

2.1 Ligging

Het geïnventariseerd gebied bevindt zich in het zuidoosten van Noord-Brabant in de gemeenten Bergeijk plaatselijk bekend als het gebied de Stevensbergen en is gelegen in een bosrijke omgeving. In de atlasblokken 57-22 en 57-32 en in de respectievelijke kilometerhokken 53 en 13 (zie bijlage 1).

De oppervlakte van het totale gebied bedraagt ca. 45ha. Het geïnventariseerde gebied is ca 20ha. groot.

Het gebied Stevensbergen is gedeeltelijk in eigendom van Natuurmonumenten (20ha) en gedeeltelijk particulier bezit.

Het hele gebied is omgeven door zandwegen.

2.2 Vegetatie

Stevensbergen bestaat gedeeltelijk uit stuifzand, gedeeltelijk uit heide en gedeeltelijk uit dennenbos.

In het stuifzand gedeelte bestaat de bovenbegroeiing alleen uit hier en daar een Zeeden.

Op het gedeelte van de heide is de bovenbegroeiing variërend van Zeeden, Grove Den, Berk, tot Zomereik. Het bosgedeelte bestaat hoofdzakelijk uit Grove Den.

Verder is er langs de randen van het gebied een enkele Zomereik en berk te vinden.

Als onderbegroeiing is in het stuifzand gedeelte mossen en grassen te benoemen.

Het heide gebied bestaat buiten de heide ook uit grassen, mossen en jonge berken.

De onderbegroeiing in het bosgebied bestaat hoofdzakelijk uit grassen.

Ook staat er nog een Jeneverbes in het geïnventariseerd gebied.

3 Territoria

3.1 Aantal vastgestelde territoria

Kaart	Soort	Aantal	Kaart	Soort	Aantal
1	Houtduif	2	13	Tjiftjaf	2
2	Zomertortel	1	14	Fitis	10
3	Koekoek	1	15	Matkop	1
4	Nachtzwaluw	5	16	Kuifmees	4
5	Grote Bonte Specht	1	17	Zwarte Mees	1
6	Boomleeuwerik	3	18	Pimpelmees	1
7	Boompieper	7	19	Koolmees	5
8	Heggenus	1	20	Boomkruiper	2
9	Roodborst	8	21	Gaai	1
10	Gekr. Roodstaart	1	22	Zwarte Kraai	2
11	Roodborsttapuit	3	23	Vink	7
12	Zwartkop	2	24	Geelgors	2

In totaal zijn 73 territoria vastgesteld. Op 24 soortkaarten zijn deze territoria aangegeven.

4 Conclusie

4.1 Vogeldichtheden

Het geïnventariseerd gebied Stevensbergen heeft een broedvogeldichtheid van 3,65 paren/ha.

Dit gebied leent zich uitstekend voor de Boomleeuwerik, Boompieper en de Roodborsttapuit, die dan ook respectievelijk 3, 7 en 3 territoria bezet hebben. Deze soorten hebben territoria in het midden van het gebied. Verder komen er in het gebied 1 territoria van de Gekraagde Roodstaart en 2 van de Geelgors voor. Ook is de Nachtzwaluw met 5 territoria goed vertegenwoordigd.


De grootste vogeldichtheid voor de reguliere vogelsoorten zoals Roodborst, Zwartkop, Tjiftjaf en Koolmees wordt bereikt aan de randen van het gebied.

Er is ook 1 territoria van de Zomertortel vastgesteld, dit is uitzonderlijk omdat deze soort de laatste tijd sterk in aantal is afgenomen.

Ook is het vermelden waard, dat er tijdens het inventariseren aan de rand van het gebied een aantal van 11 Haakbekken (zeer zeldzaam) is waargenomen. Helaas zijn deze vogels nadien niet meer gezien.

4.2 Samenvatting


Het gebied Stevensbergen is in het voorjaar 2009 door de vogelwerkgroep I.V.N. Bergeijk/Eersel op broedvogels gekarteerd. Voor deze kartering is de B.M.P. methode toegepast. Het terrein heeft een oppervlakte van ongeveer 20ha. In het gebied zijn 24 soorten broedvogels vastgesteld. Hiervan staan de Nachtzwaluw de Zomertortel en de Matkop op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten.



Kaart 1
Houtduif 2.




Kaart 2
Zomertortel 1x



Kaart 3
Koekoek 1x



Kaart 4
Nachtzwaluw 52



Kaart 5
Grote Bonte Specht 1x




Kaart 6
Boomleeuwerik 3x



Kaart 7
Boompieper 7x



Kaart 8
Heggemus 1.




Kaart 9
Roodborst 8




Kaart 10
Gekraagde Roodstaart 1



Kaart 11
Roodborsttapuit 3:




Kaart 12
Zwartkop 2x



Kaart 13
Tjiftjaf 2x




Kaart 14
Fitis 10x




Kaart 15
Matkop 1x



Kaart 16
Kuifmees 4x




Kaart 17
Zwarte Mees 1x




Kaart 18
Pimpelmees 1x




Kaart 19
Koolmees 5x



Kaart 20
Boomkruiper 2x




Kaart 21
Gaai 1x



Kaart 22
Zwarte Kraai 2x



Kaart 23
Vink 7x



Kaart 24
Geelgors 2x