

Soortenlijst langs Abel Tasmanpad

Vanaf ingang Rikkerdapad t/m moerasbosje

20 mei 2026, PWG

Aanwezig: Herman de Meijer [verslag], Herman de Heer, Aren van Waarde, Maria van Waarde, Garnt Renkema, Anje Westera. En als gast Grietje Pel.

We liepen het pad vanaf de ingang bij de Frans Visscherstraat 8 in zuidelijke richting tot en met het moerasbosje.

De route liep over een halfverhard pad naar een weiland (alleen al hierin ruim 30 algemene soorten) en verder over graspaden, langs houtsingels, half- en geheel droogstaande sloten, bloemrijke hooilanden in verschillende stadia van verschraling/voedselrijkdom, een ingezaaide bloemrijke akkerrand (opvallende soorten hier zijn met ** gemerkt) en een stukje moerasbos.

Eén van ons liep nog even verder naar een aantal petgaten waar hij uitdrogend krabbenscheer op de uitdrogende bodem zag liggen (niet in de lijst opgenomen).

Vaatplanten

Aalbes	(Ribes rubrum)	
Akkerdistel	(Cirsium arvense)	
Akkerkool	(Lapsana communis)	
Basterdwederik spec.	(Epilobium spec.)	
Bitterzoet	(Solanum dulcamara)	
Boswilg	(Salix caprea)	♀ struik
Braam met vijftalig blad	(Rubus spec. uit de sectie Zwarte bramen)	
Brede stekelvaren	(Dryopteris dilatata)	
Duizendblad **	(Achillea millefolium)	
Echte koekoeksbloem	(Silene flos-cuculi)	
Eenstijlige meidoorn	(Crataegus monogyna)	
Egelboterbloem	(Ranunculus flammula)	
Engels raaigras	(Lolium perenne)	
Fluitenkruid	(Anthriscus sylvestris)	
Geknikte vossenstaart	(Alopecurus geniculatus)	
Gele kamille **	(Anthemis tinctoria)	
Gele lis	(Iris pseudacoris)	
Gestreepte witbol	(Holcus lanatus)	
Gevleugelde kardinaalsmuts	(Euonymus alatus)	aangeplant !
Gewone Es	(Fraxinus excelsior)	
Gewone hennepnetel	(Galeopsis tetrahit)	
Gewone hoornbloem	(Cerastium fontanum subsp. vulgare)	
Gewone lijsterbes	(Sorbus aucuparia)	
Gewone margriet **	(Leucanthemum vulgare)	
Gewone vlier	(Sambucus nigra)	
Grauwe wilg	(Salix cinerea)	
Grote brandnetel	(Urtica dioica)	
Grote Kaardebol **	(Dipsacus fullonum)	
Grote kattenstaart	(Lythrum salicaria)	
Grote ratelaar	(Rhinanthus angustifolius)	
Grote vossenstaart	(Alopecurus pratensis)	
Grote weegbree	(Plantago major subsp. major)	

Haagwinde	(Calystegia sepium)
Harig Wilgenroosje	(Epilobium hirsutum)
Heermoes	(Equisetum arvense)
Hondsdrif	(Glechoma hederacea)
Hondsroos	(Rosa canina)
Honingklaver spec. **	(Melilotus spec.)
Hopklaver **	(Medicago lupulina)
Kale jonker	(Cirsium palustre)
Kleefkruid	(Galium aparine)
Klimop	(Hedera helix)
Kluwenhoornbloem	(Cerastium glomeratum)
Knoopkruid **	(Centaurea jacea)
Knopig helmkruid	(Scrophularia nodosa)
Kool spec. **	(Brassica spec.)
Kropaar	(Dactylis glomerata)
Kruipende boterbloem	(Ranunculus repens)
Kweek	(Elymus repens)
Look-zonder-look	(Alliaria petiolata)
Madeliefje	(Bellis perennis)
Mannetjesvaren	(Dryopteris filix-mas)
Melkeppe	(Peucedanum palustre)
Moeraszegge	(Carex acutiformis)
Oeverzegge	(Carex riparia)

N.B.: *Oeverzegge en Moeraszegge lijken veel op elkaar.*

De Oeverzegge is robuuster en heeft wat bredere bladen dan de Moeraszegge.

Kenmerkend voor de Moeraszegge is de stand van de rechtopstaande schutbladen van de vrouwelijke aren(bloemen) .

Oeverzegge heeft 3-5 mnl. aren, Moeraszegge 2-3.

Het laatste verschil, tongetje Oeverzegge is stomp, tongetje Moeraszegge spits.

Paardenbloem	(Taraxacum officinale s.l.)	
Pijpenstrootje	(Molinia caerulea)	
Pinksterbloem	(Cardamine pratensis)	
Pitrus	(Juncus effusus)	
Raapzaad	(Brassica rapa subsp. oleifera)	
Rankende helmbloem	(Ceratocarpus claviculata)	
Ridderzuring	(Rumex obtusifolius)	
Riet	(Phragmites australis)	
Rietgras	(Phalaris arundinacea)	
Ringelwikke	(Vicia hirsuta)	vegetatief
Rode klaver	(Trifolium pratense)	
Rogge **	(Secale cereale)	
Schapezuring	(Rumex acetosella)	
Scherpe boterbloem	(Ranunculus acris)	
Schietwilg	(Salix alba)	
Slipbladige ooievaarsbek	(Geranium dissectum)	
Smalle weegbree	(Plantago lanceolata)	
Smeewortel	(Symphytum officinale)	
Speenkruid	(Ficaria verna subsp. verna)	

Straatgras	(Poa annua)	
Tuinradijs **	(Raphanus sativus)	
Tweerijige zegge	(Carex disticha)	
Veelkleurig vergeet-mij-nietje	(Myosotis discolor)	
Venkel **	(Foeniculum vulgare)	
Veldzuring	(Rumex acetosa)	
Vogelkers	(Prunus padus)	
Wateraardbei	(Comarum palustre)	
Watertorkruid	(Oenanthe aquatica)	op bodem drooggevalen sloot
Wijfjesvaren	(Athyrium filix-femina)	
Wilde kamperfoelie	(Lonicera periclymenum)	
Wilde lijsterbes	(Sorbus aucuparia)	
Wilde peen **	(Daucus carota)	
Witte klaver	(Trifolium repens)	
Zachte dravik	(Bromus hordeaceus)	
Zilverschoon	(Potentilla anserina)	
Zomereik	(Quercus robur)	
Zwarte els	(Alnus glutinosa)	
Zwarte zegge	(Carex nigra)	

En de bijvangst:

- Insecten

Oranjetip	(Anthocharis cardamines)	♀, rustend op koolbloempje
Spuugbeestje/ schuimcicade	(Philaenus spumarius))	
Waterjuffer	(Fam. Coenagrionidae)	

- Vogels (gehoord)

Fazant	(Phasianus colchicus)
Koekoek	(Cuculus canorus)
Rietgors	(Emberiza schoeniclus)
Sprinkhaanrietzanger	(Locustella naevia)
Tuinfluitter	(Sylvia borin)

- Dier(sporen)

Mol	(Talpa europaea)	Molshopen in graspaden
-----	------------------	------------------------

- Amfiëën

Bruine kikker	(Rana temporaria)
---------------	-------------------

- Paddenstoelen

Houtzwam spec.	(Polyporus spec.)
----------------	-------------------