



Woe. 11 mrt. Algemene Ledenvergadering, vanaf 19.30 uur in Aan 't Paedje aan de Zuivelstraat in Baarlo. Na de pauze geeft Gerard Compiet een lezing met als titel: 'Een vliegende kraai vindt altijd wat'. Alle inheemse kraaiachtigen, inclusief de raaf maken in deze lezing hun opwachting. De kraaiachtigen zijn interessante beesten. Dit vooral vanwege hun groot aanpassings- en leervermogen. Vanaf 20.00 uur zijn ook niet-leden welkom!

Za. 21 mrt. Nederland Schoon. We gaan weer opruimen i.s.m. Venlo Schoon is er een opruimactie in het kader van Maas Cleanup. Tijdstip: 10.00 – 12.30 uur, locatie: Barbara's Weerd in Arcen. Wil je ook meehelpen? Meld je aan bij: [info@venloschoon.com](mailto:info@venloschoon.com)

Zo. 22 mrt.    Vogelexcursie. We vertrekken om 8.00 uur vanaf de Geldmaat in Baarlo. De excursie start om 8.30 uur vanaf de Zwarte Plakweg (routeplanner Zwarte Plakweg 89) in America. Tip: Neem een verrekijker mee!!

Zo. 19 apr.    Landschapsexcursie bij Kasteel Huijs Ooijen, meer info volgt t.z.t.

Kijk voor meer IVN-activiteiten in de buurt op de website van onze collega-afdelingen!



Website: [www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree](http://www.ivn.nl/afdeling/baarlo-maasbree)  
e-mail adres: [IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com](mailto:IVN-baarlo-maasbree@hotmail.com)



[www.instagram.com/ivnbaarlomaasbree](https://www.instagram.com/ivnbaarlomaasbree)



**Rabobank**  
Venlo e.o.

Voor € 20,- per jaar bent u lid. U kunt dan meedoen met alle activiteiten en u ontvangt maandelijks ons krantje met info en het programma.



**ivn** natuur  
educatie  
Baarlo-Maasbree



## Beleef de natuur

# Ós Greun Blaedje

Maart 2026

Afd. Baarlo Maasbree

Op woensdag 11 maart 2026 vindt de Algemene Ledenvergadering van IVN Baarlo-Maasbree vanaf 19.30 uur plaats in Aan 't Paedje te Baarlo.

Alle leden zijn natuurlijk van harte uitgenodigd om op deze avond aanwezig te zijn.

Iedereen die deze avond aanwezig is ontvangt gratis het boekje: 'De levende planeet aarde, het belang van de natuur'. Dit boekje is geschreven door Janic Grond en het boekje is bedoeld voor iedereen die het voortbestaan van de natuur op aarde aan het hart gaat.

Na afloop van het officiële gedeelte van de vergadering, volgt er een pauze en daarna geeft Gerard Compiet een lezing met als titel: 'Een vliegende kraai vindt altijd wat'.

Vanaf 20.00 uur zijn ook niet-leden welkom om de lezing bij te wonen. De officiële uitnodiging voor deze bijeenkomst zit als bijlage bij dit ledenblad.

Graag tot ziens op woensdag 11 maart in Aan 't Paedje!

Bestuur IVN Baarlo-Maasbree

## Een nieuw dak voor het insecthotel in het Kuukven



Al sinds het voorjaar van 2016 staat het insectenhotel van IVN Baarlo-Maasbree in het Kuukven.

Het dak was aan vervanging toe en Mark van de faunawerkgroep heeft deze klus geklaard.

Er ligt een mooi nieuw leistenen dak op.

Mark, hartelijk dank voor je inzet!

De insecten hebben weer voor jaren een mooi droog onderkomen.



## De rammeltijd is weer begonnen

Doorgaans worden hazen overdag alleen gezien als ze zich bewegen, maar meestal zitten ze stil en vallen ze minder op. Tijdens de rammeltijd verandert het gedrag totaal. De haas zit niet meer stil, maar gaat actief op zoek naar zijn soortgenoten om te zorgen voor de volgende generatie. Hierbij wordt veel gerend en gebokst.

Als je ernaar kijkt is meteen duidelijk waarom dit boksen wordt genoemd. De hazen gaan op hun achterpoten staan en proberen met hun voorpoten de ander te raken. Toch gebeurt het vaker dat het niet twee rammelaars zijn die elkaar de tent uitvechten, maar een vrouwtje (moer) en een mannetje (ram). Als een moer niet gediend is van de avances van een rammelaar, geeft ze hem een paar rake klappen om hem weg te jagen.

Als je een aantal hazen achter elkaar door een veld ziet rennen, is de voorste vaak de moer en zijn die erachter meerdere rammen. Uiteindelijk stopt de moer en blijft de rammelaar met de beste conditie over. Hij moet nog wel een paar klappen van de moer verduren. Kiest hij dan niet het hazenpad, dan mag hij paren. Als alles goed gaat worden ongeveer veertig dagen later jonge hazen geboren, klaar om zelfstandig in het veld te liggen tot het moederdier komt zogen.



Per jaar kan een vrouwtje zo'n vier nestjes krijgen. In tegenstelling tot bij konijnen, worden hazen volledig behaard en met open oogjes geboren. Hierdoor kunnen ze tegen kou en hebben ze meteen een goede schutkleur. De moer kiest een goede beschutte plek voor de jongen uit om ze zo veilig mogelijk achter te laten. De beschutting bestaat vaak uit lang gras.

Ze heeft daarnaast nog een goede manier om de overlevingskansen van haar jongen te vergroten. Ze laat de jongen alleen achter waardoor het voor mensen lijkt dat ze aan hun lot overgelaten worden. Doordat de moer niet heel vaak in de buurt is, geeft ze haar geur echter niet af aan de jongen. Hierdoor zijn ze nóg moeilijker te vinden voor predatoren zoals vossen of huiskatten.

Mocht je zelf een jonge haas tegenkomen, geniet dan heel kort van het moment, en laat het jong op zijn plek. Als het goed is, is het moederdier in de buurt en is tussenkomst van mensen niet nodig. Zo kan worden voorkomen dat hazen onnodig in de wildopvangcentra komen. In de natuur met hun moeder hebben ze de beste overlevingskansen.

De bronsttijd duurt lang, tot in augustus of september. De rennende hazen zijn nog goed te zien tot in maart of april, daarna wordt het gras langer en is de strijd voor ons grotendeels onzichtbaar.

Bron: Nature Today

Foto: Suzanne

## Uitslag Nationale Tuinvogeltelling 2026

Al jaren bestaat de top drie van de Nationale Tuinvogeltelling uit de huismus, de koolmees en de pimpelmees. Dit jaar is de huismus voor het eerst in 23 jaar niet op de eerste plaats geëindigd. De huismus werd 9% minder gezien in de tuinen ten opzichte van vorig jaar. De koolmees neemt dit jaar de eerste plaats over. Daarmee wordt de huismus dus na ruim twee decennia van de troon gestoten.

De afname van de huismus begon al in de jaren tachtig, voornamelijk door verstening van tuinen en openbaar groen. Dit leidde tot een landelijke achteruitgang van meer dan 50%. De afgelopen jaren leken de aantallen zich te stabiliseren en was zelfs sprake van enig herstel. De verwachting was dan ook dat de huismus zijn koppositie zou behouden. Toch werd de huismus in minder tuinen gezien en daalde de gemiddelde groepsgrootte, zodat ook het totaal aantal huismussen in de telling is gedaald. Wat de exacte reden is van de afname van de huismus moet nader onderzocht worden. Vroegtijdige conclusies zijn moeilijk en daarom is het noodzakelijk om de mogelijke oorzaken van de daling beter te onderzoeken.


Dat de huismus het moeilijk heeft, heeft alles te maken met hoe we onze tuinen en openbare ruimten inrichten. Veel steen, weinig beplanting of zelfs exotische planten. Daar kan een huismus niet van leven. Door onze tuinen vogelvriendelijker in te richten met (biologische) inheemse beplanting, kunnen we bijdragen aan een betere leefomgeving van de huismus.

In oktober werd tijdens de najaarstrek een invasie waargenomen van ongewoon grote aantallen pimpelmezen. Dit effect is waarschijnlijk terug te zien in de tuintellingen: de pimpelmees staat in de voorlopige tussenstand op nummer drie en werd in 9% meer tuinen geteld dan vorig jaar.

Opvallend is de comeback van de spreeuw, die na een afwezigheid van bijna 10 jaar terugkeert in de top-10. Waar de huismus terrein verliest, laten spreeuwen een tegengestelde trend zien: grotere groepen en een duidelijke toename in het aantal tuinen waarin ze zijn waargenomen. Ook zien we een kleine toename bij halsbandparkieten en merels.

Bron: Vogelbescherming Nederland

## Een mooie ontmoeting



Op vrijdag 6 februari ontdekte Suzanne deze prachtige vogel tijdens een winterwandeling.

De koperwiek is een kleine lijster, met een opvallende wenkbrouwstreep en opvallende roestbruin/oranje flanken en oksels. De soort is vaak te horen in oktober/november, als ze in de nacht in grote groepen over ons land trekken. In Noord-Europa is de koperwiek een talrijke broedvogel van naald- en berkenbossen. In de winter trekken ze naar het zuidwesten. Veel koperwieken overwinteren in Nederland. Wanneer de winter te koud wordt, verlaten ze ons land weer en trekken verder naar het zuiden, of verplaatsen ze zich naar de stad, waar het warmer is.

De voorjaarsstrek begint in maart en is half april voorbij, het is geen massale trek, zoals in het najaar. Waarnemingen van koperwieken tussen half mei en begin september zijn bijzonder zeldzaam. Voor zover bekend zijn er geen broedgevallen van de koperwiek in Nederland voorgekomen.

Tekst: Vogelbescherming Nederland/Sovon

Foto: Suzanne

## **Tienduizenden kraanvogels hebben vogelgriep niet overleefd**

Afgelopen najaar werden duizenden kraanvogels opgeschrikt door een forse uitbraak van het vogelgriepvirus H5N1. In Duitsland, Frankrijk en Spanje zijn ruim veertigduizend kadavers geruimd. Inmiddels lijkt er groepsimmunitet te zijn. De grote massamigratie naar het noorden is weer aan de gang.

Om een goed beeld te krijgen van hoe de kraanvogelpopulatie zich ontwikkelt, worden er iedere winter tellingen gehouden in Spanje en Frankrijk. Vele vrijwilligers voeren dan tegelijkertijd tellingen uit op de vele bekende overwinteringsplaatsen in deze landen. Door dit meerdere jaren achter elkaar te doen, krijgen we een beeld van hoe de West-Europese kraanvogelpopulatie zich ontwikkelt.

De resultaten van de eerste tellingen in Spanje zijn inmiddels binnen, en die zijn niet mals: dit jaar zijn er bijna vijftigduizend kraanvogels minder geteld dan afgelopen jaar. Nu kan dit verschillende oorzaken hebben. Bijvoorbeeld dat niet alle kraanvogels zijn geteld omdat ze zich in onbereikbaar gebied bevonden, of omdat veel kraanvogels tijdens de Spaanse tellingen nog niet de Pyreneeën waren overgestoken en nog in Frankrijk zaten. Toch passen deze resultaten bij een forse impact van de vogelgriep, ook als we kijken naar de ruim veertigduizend dode kraanvogels die in geheel Duitsland en Frankrijk zijn gevonden en geruimd. Op basis van deze informatie is de inschatting dat zo'n tien procent van de kraanvogelpopulatie de vogelgriep niet heeft overleefd. Een bittere pil dus.

De laatste jaren ging het gelukkig behoorlijk goed met de kraanvogel. In totaal telt de populatie in Europa ruim een half miljoen kraanvogels. Dit is het resultaat van goede bescherming van hun leefgebied. Door bescherming en herstel van natte veengebieden, hebben kraanvogels succesvol kunnen broeden en is de totale populatie de laatste decennia gestaag toegenomen tot spectaculaire aantallen. Ook in Nederland broeden er inmiddels kraanvogels in verschillende veengebieden. Maar verreweg de meeste kraanvogels broeden in Scandinavië en de Baltische Staten.

Inmiddels zijn de kraanvogels letterlijk en figuurlijk weer op hun retour na de vogelgriepuitbraak. Er zijn geen nieuwe sterfgevallen of uitbraken meer vastgesteld, wat betekent dat er inmiddels sprake is van groepsimmunitet. In letterlijke zin keren de kraanvogels nu langzaam terug naar hun broedgebieden. Er zijn zelfs boven Nederland alweer behoorlijk wat trekkende kraanvogels gezien, waarmee we kunnen concluderen dat de voorjaarstrek is begonnen.

De kraanvogels zullen naar verwachting vanaf eind februari/begin maart massaal richting de Scandinavische veengebieden trekken om te broeden. Nu is het hopen op een nat voorjaar daar, zodat de kraanvogels hun jongen veilig groot kunnen brengen en de populatie langzaam van de tegenslag kan herstellen.

Bron: Nature Today

Tekst: Koen de Koning, Leerstoelgroep Earth Systems and Global Change, Wageningen University



## Paddentrek van start

Na een opvallend koude periode in januari en februari zorgen de stijgende temperaturen voor het startsein van de jaarlijkse paddentrek. In heel Nederland trekken padden, kikkers en salamanders van hun overwinteringsplaatsen naar het water om zich voort te planten. Een indrukwekkend voorjaarsritueel – maar ook een tocht vol gevaren, vooral bij het oversteken van wegen.



De paddentrek start wanneer de omstandigheden – temperatuur en luchtvochtigheid – gunstig zijn. Tijdens milde en natte perioden kan een groot deel van de populatie in korte tijd richting het voortplantingswater trekken. Afhankelijk van de locatie kan het daarbij om honderden tot duizenden dieren per nacht gaan. Tijdens de jaarlijkse trek worden amfibieën geconfronteerd met verschillende bedreigingen. Zo kunnen drukke wegen en fietspaden dodelijk zijn. Daarom zijn er verspreid over het land honderden vrijwilligers in werkgroepen actief, die de dieren veilig helpen oversteken.

Via de openbare website <https://www.padden.nu/> het centrale meldpunt van de paddentrek, geven paddenwerkgroepen hun overzetresultaten door. De verzamelde gegevens zorgen voor een actueel landelijk beeld van de paddentrek en de ontwikkeling van amfibieënpopulaties in Nederland.

Die inspanningen van vrijwilligers zijn hard nodig, want het gaat niet goed met de gewone pad. In de afgelopen twintig jaar is het aantal padden in Nederland met ruim veertig procent afgenomen. Dit heeft waarschijnlijk een aantal oorzaken, van insectensterfte tot vervuiling en versnippering van het leefgebied.

Daarnaast belanden in Nederland jaarlijks tot wel een miljoen amfibieën in straatputten. Eenmaal in deze putten kunnen zij niet meer ontsnappen, met de dood tot gevolg.

Voor amfibieën die in straatputten terechtkomen, zijn inmiddels effectieve oplossingen beschikbaar. Met eenvoudige voorzieningen, zoals een kikker- en paddentrap, kunnen dieren zelfstandig uit straatkolken klimmen. De website <https://paduitdeput.nl/> biedt praktische oplossingen en handvatten voor gemeenten, bedrijven en particulieren.

Bron: Nature Today, tekst: RAVON

Foto's Suzanne: Gewone pad en Kleine watersalamander



## Op zoek naar de blauwborst in de Mariapeel

Op zondag 22 maart gaan we samen met onze vogeldeskundigen op zoek naar de blauwborst in de Mariapeel.

Een van de eerste zangvogels die terugkomt uit Afrika is de mooi gekleurde blauwborst. Deze insecteneter is vanaf eind maart/begin april weer te bewonderen langs de vennen in de peel.

Zo geheimzinnig als de vogel in de broedtijd is, zo opvallend is zijn baltsritueel in het vroege voorjaar. De blauwborst zingt het liefst vanaf een verhoging in het riet met zijn blauwe borst met witte vlek opvallend vooruit. De vogel is een meester in het imiteren van andere vogels die naast hem in het territorium leven. De zang begint meestal met het 'aanlopen' van een wiel, waarna een kakofonie van allerlei vogelsoorten volgt. Om zijn lied kracht bij te zetten stijgt het mannetje al zingend de lucht in om vervolgens met zijn uitgewaaierde bruinrode staart als een parachute naar beneden te komen.

Het vrouwtje leeft zeer verborgen en nadert het mannetje vaak over de grond waarna een korte paring volgt.

Het nest wordt netjes aan de voet van wat rietstengels of moerasplantjes gebouwd waarna de eieren gelegd worden. Vanaf dat moment lijken de blauwborsten van het toneel te verdwijnen, maar ze zijn wel degelijk aanwezig om te zorgen voor hun nakomelingen.

We vertrekken om 8.00 uur vanaf de p-plaats bij de Geldmaat in Baarlo. De excursie start om 8.30 uur vanaf de Zwarte Plakweg (routeplanner Zwarte Plakweg 89) in America.

## Een druilerige ochtend op de Groote Heide

Op zondag 22 februari staan 10 belangstellenden klaar om tegen 10.00 uur te vertrekken voor een ontdekkingsstocht naar korstmossen. Onze gids van vandaag, Peter Eenshuistra staat ons al op te wachten.

De weersvoorspellingen voor deze ochtend zijn niet al te best, maar tijdens het eerste uurtje van onze wandeling over de Groote Heide in Venlo blijft het nagenoeg droog.

De eerste waarneming betreft het Gestippeld schildmos op de stam van een eik. Onze gids legt uit dat in de wereld van de planten, de korstmossen een aparte plaats innemen.

Een korstmos bestaat uit een schimmel en een alg, die in symbiose leven. Een symbiose is een samenlevingsvorm tussen twee levende organismen, waarvan beide profiteren. De schimmel zorgt voor water, zouten en een vochtige omgeving waarin de alg kan leven, terwijl de alg door middel van fotosynthese de schimmel van suikers voorziet. Door deze samenwerking kunnen ze leven op plaatsen waar andere organismen het moeilijk hebben of zelfs helemaal niet groeien. De schimmel geeft een korstmos zijn typische vormen zoals korsten, bekers of geweien. De alg geeft een korstmos zijn typische kleur.

In Nederland groeien in totaal zo'n zeshonderd soorten korstmossen en ze groeien erg langzaam. Soms niet meer dan 0,1 mm per jaar en je ziet ze daarom vooral daar waar ze niet door zaadplanten worden verdrongen. Op de Groote Heide in Venlo vinden we grondkorstmossen op open hei, gras en zandgrond, boomkorstmossen op vrijstaande bomen en steenkorstmossen op losse stenen en betonrestanten.

We gaan door een klaphekje het natuurgebied in en even later verlaten we het zandpad en op het talud staat Gevorkt heidestaartje en Klein leermos. Dit laatste korstmos groeit op kalkrijke ondergrond. Op deze plek lag ooit een van de start- en landingsbanen van het voormalige vliegveld Fliogerhorst. De betonlaag is inmiddels verwijderd, maar er zit nog steeds kalk in de ondergrond.

Bij de leermossen gaat het om een symbiose tussen een schimmel en een blauwalg (en dus niet met een groene alg). Blauwalgen zijn geen planten, maar cyanobacteriën. Deze bacteriën zijn tot fotosynthese in staat en daarom dus ook interessant als samenwerkingspartner voor de schimmel. We struinen verder en zien het Kronkelheidestaartje en het Vals kronkelheidestaartje.

*Lees verder op de volgende bldz.*



Er staat ook Bruin bekermos, gemakkelijk herkenbaar aan de vorm. De bekers zijn grijsgroen van kleur en vaak grotendeels bruin aangelopen en de buitenzijde van de beker heeft schubjes.



Veel korstmossen hebben vooral een ongeslachtelijke voortplanting. Het korstmos laat korrels los of er breken speciale staafjes af en deze fragmentjes verspreiden zich door de wind of door dieren.

Korstmossen zijn gevoelig voor luchtverontreiniging. Sommige soorten verdwijnen in gebieden waar de concentratie zwaveldioxide (SO<sub>2</sub>) hoog is. De aan- of afwezigheid van korstmossen wordt daarom wel gebruikt als een indicator voor luchtverontreiniging.

Onze gids raapt een dor takje op en als we de korstmosjes die erop te vinden zijn met de loop bekijken, dan zien we de prachtige felle kleuren van het Groot dooiermos en het Kapjesvingermos.

We lopen verder over een zandpad en dan zien we enkele berken die echt helemaal vol staan met korstmossen. We besluiten om ze van dichterbij te gaan bekijken en we zien Sierlijk schildmos, Verborgten schildmos en Groene poederkorst.

Dan begint het hard te regenen en dat is jammer. Toch trotseren we nog een tijdje de weersomstandigheden en daardoor kunnen we nog het spectaculaire Open rendiermos bewonderen. Dit korstmos ziet eruit als een sterk vertakt groengrijs minustruikje en lijkt wel wat op het gewei van een rendier. Een kenmerk is de holle stengel, die je met een loepje goed kunt zien. Er staat slechts één klein groepje van dit speciale mos op de Groote Heide en dat hebben we vandaag dankzij onze gids te zien gekregen.

We lopen verder naar een aantal berken die eveneens vol staan met korstmossen en we zien het Gewoon purperschaaltje, Fijn bekermos, Gewoon schildmos, Eikenmos, Melig takmos en Smal bekermos.

Naast de prachtige korstmossen bewonderen we ook nog enkele paddenstoelen: de Oranje oesterzwam, Echte tonderzwam en Berkenweerschijnzwam.

Rond 11.45 uur zijn we terug bij het beginpunt van de wandelling en we zijn zeer tevreden met deze zeer geslaagde en leerzame ochtend. Nogmaals veel dank aan onze zeer deskundige gids Peter Eenshuistra.



Bron: Korstmossen van de Groote Heide uit het Natuurhistorisch Maandblad van januari 1998 door Peter Eenshuistra

Foto's Suzanne



## Maak nu je tuin klaar voor het broedseizoen

Je tuin klaarmaken voor het broedseizoen dat gemiddeld genomen duurt van maart tot juli, betekent vogels helpen met nestgelegenheid, nestmateriaal en voedsel.

Door nu actie te ondernemen, maak je van je tuin een veilige broedplaats. Hier is een stappenplan om je tuin voor te bereiden:

### 1. Nestgelegenheid en Schuilplekken

Hang nestkastjes op: Maart is de uiterste maand, maar de herfst/winter is nog beter omdat vogels dan aan de kast kunnen wennen.

Locatie: Hang nestkasten op een rustige, beschutte plek, niet in de volle zon en bij voorkeur met de opening op het noordoosten/oosten (uit de regen en wind).

Schoonmaken: Controleer oude nestkastjes en maak ze schoon met heet water.

Struiken en hagen: Plant besdragende struiken zoals vuurdoorn, kardinaalsmuts of meidoorn. Deze bieden niet alleen voedsel, maar ook dichte schuil- nestplekken.



### 2. Nestmateriaal Aanbieden

Vogels hebben materiaal nodig om hun nest te bouwen. Help ze een handje:

Laat rommel liggen: Verwijder niet alle bladeren en takjes uit de tuin. Vogels gebruiken dit graag. Bied materialen aan: Leg droog mos, takjes, bladeren, hooi of wol neer op een schaalte of in een korfje.

### 3. Voeding en Water

In het vroege voorjaar kunnen vogels extra energie gebruiken voor het bouwen van nesten.

Eiwitrijk voer: Schakel in de lente over op eiwitrijk voer in plaats van vetrijk voer. Denk aan meelwormen, insectenmixen en zonnebloempitten.

Kalk is essentieel voor de eierschaalvorming. Vergruis eierschalen en strooi dit in de tuin.

Drinkwater: Zorg voor een (vogel)badje met vers water en maak dit regelmatig schoon.

Veilig voeren: Maak voedertafels en -huisjes regelmatig schoon om ziektes te voorkomen.

### 4. Wat je niet moet doen

Zorg voor rust en veiligheid, dus stel het snoeien van hagen, struiken en bomen uit tot na het broedseizoen. Controleer bij noodzakelijk werk altijd eerst op aanwezige nesten.

Hang geen vetbollen in plastic netjes op; vogels kunnen hierin verstrikt raken.

Zorg ervoor dat katten niet gemakkelijk bij de nestkastjes kunnen komen.

Door deze stappen te volgen, creëer je een oase waar vogels veilig hun jongen kunnen grootbrengen.

Bron: google.com/AI

Foto: Els

## Pesticiden in vogelzaad en vetbollen

Mensen die tuinvogels bijvoeren geven ze misschien onbedoeld PFAS-pesticiden. Dit blijkt uit een steekproef van tuinvogelvoer door Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL). Van de 5 gevonden soorten pesticiden in 13 tuinvogelvoerproducten bleken er 2 een PFAS. Vorig jaar werden geen PFAS-pesticiden gevonden. De uitkomst is in lijn met de algemene trend dat steeds meer PFAS-pesticiden worden gebruikt.

Vorig jaar deed PAN-NL soortgelijke testen en werden er meer soorten pesticiden gevonden, was het gehalte hoger en dit jaar bleek in tegenstelling tot vorig jaar niet-biologisch tuinvogelvoer soms vrij van pesticiden. Van de 7 onderzochte gangbare vogelzaden zijn 5 besmet met insecticiden.

In het vogelzaad van Albert Heijn en Kruidvat is het hoogste aantal van 3 verschillende pesticiden gevonden, en in het bij Welkoop gekocht gangbaar vogelzaad van Vogelbescherming Nederland het hoogste totaalgehalte van 0,57 mg/kg. In het gangbare vogelzaad van Groenrijk en Jumbo zijn geen residuen boven de gangbare kwantificatielimiet van 0,01 mg/kg of hoger aangetroffen. In het vogelzaad van Action is een PFAS-omzettingsproduct van het PFAS-insecticide flonicamide gevonden.

In het biologisch vogelvoer van Groenrijk zijn geen pesticiden gevonden

Kijk voor meer info op:

<https://www.pan-netherlands.org/pesticiden-in-vogelvoer-en-vetbollen-tuinvogels/>

Bron: Publicaties Pesticide Action Network (PAN)

Wat kan jij doen?

Het advies van Vogelbescherming Nederland:

Je helpt vogels het meest met een gevarieerde en gifvrije tuin met inheemse planten en struiken, bessen, insecten, een lapje gras en liefst niet al te netjes. Daar vinden ze volop voedsel.

Zie onderstaande link voor meer informatie over het vogelvoer van Vogelbescherming Nederland.

<https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/vogelvoer-is-veilig-maar-bestrijdingsmiddelen-blijven-een-zorg>

