

Activiteiten plantenwerkgroep IVN Borger-Odoorn



De werkgroep is in 2020 begonnen met de inventarisatie van de plantengroei in het oostelijk deel van de Flessenhals. We beperkten ons toen tot het gebied dat begrensd wordt door de Kanaaldijk, de Eeserstraat en het Voorste diep. Het terrein werd in april en juli bezocht. Wat ons toen vooral opviel waren de vele kwelindicatoren op een laaggelegen stuk grond ten noorden van de beek o.a. Kleine watereppe en Holpijp. Nog opvallender waren de drie groeiplekken met honderden exemplaren van de Grote boterbloem aan de beekoevers.

In 2021 werden andere delen van de Flessenhals bekeken, namelijk het deel dat ligt tussen de N34 en de Eeserstraat en het deel


rond de gegraven nieuwe meander in het oostelijk deel. Dit gebied noemden we de Sahara omdat in dit deel de zandige ondergrond aan de oppervlakte ligt.



Flessenhals- overzicht



Flessenhals west



Flessenhals - Sahara



Flessenhals west

Het eerstgenoemde terrein werd op 7 mei, 8 juli en 10 september bezocht. Interessant zijn de flauw verlopende oeverzone van de nieuw gegraven beek en een tweetal kleine plasjes. Het al bestaande grasland is niet opnieuw ingericht. Met name in de oeverzone werden leuke vondsten gedaan. Opvallend was dat we zo kort na de herinrichting al Moeraskartelblad vonden.

Ook Moerasbasterdwederik (gevoelige soort*), Donkergroene basterdwederik (kwetsbare soort*), Gewoon langbaardgras (nieuwe soort voor ons), Klein bronkruid (nieuwe soort voor ons) en Grote egelskop zijn leuke vondsten.

De vondst van diverse kwelindicatoren zoals Kleine watereppe, Beekpunge, Gevleugeld hertshooi, Waterviolier en Holpijp maken het gebied veel belovend.

** volgens de Heukels' flora van Nederland 2020*

Sahara



We vinden het leuk om de komende tijd bij te houden welke planten we vinden in dit maagdelijke terrein dat is afgegraven tot op het gele dekzand. In de zomer van 2021 was de zandige bodem voor 10 - 15% bedekt met vegetatie.

Het terrein bleef overigens niet lang maagdelijk. Heel opvallend was de vondst in het vroege voorjaar (april) van honderden exemplaren van het plantje Vroegeling. Van dit eenjarige plantje is bekend dat het al in de herfst kiemt, als rozet overwintert en vanaf februari bloeit (bron oecologische flora). Van kieming in de herfst kan hier

geen sprake zijn geweest want het terrein werd pas in de winter afgegraven. Ook in dit gebied vonden we al kwelindicatoren zoals Duizendknoopfonteinkruid, Gevleugeld hertshooi, Holpijp, Kleine watereppe.

Soms zeldzame soorten die we nog niet eerder gevonden hadden zijn o.a. Geel nagelkruid, Rode schijnspurrie, Stomp fonteinkruid (kwetsbare soort*) en Watergras (zeldzame soort in het Drents district*). In de Atlas Drentse flora wordt overigens geconstateerd dat Watergras ook in Drenthe vaker is waargenomen na 1970.