

Notitie verwijdering opslag Regelbergen

Aanleiding

Op vrijwillige basis worden door groepen opslag verwijderd op verschillende terreindelen. Om meer duidelijk te geven vanuit SBB leggen we in deze notitie uit waarom wij sommige beheeringrepen wel of niet uitvoeren, specifiek voor Regelbergen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden bestaan uit de volgende beheermaatregelen:

- Verwijderen van dennen en Amerikaanse vogelkers opslag op de heide. Dus geen andere soorten, zoals berken en jeneverbes.
- Dennen die voorzien zijn van een oranje/geel lint laten staan (zie figuur1)
- Takenhopen maken op de droge heide het liefst in door pijpenstrootje gedomineerde delen. Maar in geen geval op open zand, kortsmosvegetatie en hopen.
- Liefst geen hopen maken op de stuifzandheide. De hopen mogen gemaakt worden onder de aanwezige solitaire bomen en in de bosrand (zie bijlage voor locatie van de vegetatietype)
- Het vrijmaken van wegen paden van opslag die overhangt.



Figuur 1 opslag die moet blijven staan zijn aangegeven met een lintje

Onderbouwing beheermaatregel.

In het werkgebied komen (mogelijk) de volgende soorten voor die baat hebben bij het laten staan van berkenopslag en een klein deel van de dennenopslag:

- Adder
- Zandhagedis
- Gladde slang
- Draaihal
- Roodborsttapuit
- Mieren

Deze soorten komen voor in structuurrijke heide met struiken en zijn kwetsbaar voor de klimaatverandering door met name de droge en hete zomers. Zo heeft de adder enigszins zon nodig maar ook schaduw om oververhitting te voorkomen. De draaihal (die overigens niet is waargenomen

is in het werkgebied) broedt in vermolmde berken waarin een hol wordt gehakt. Om voldoende broedgelegenheid voor de toekomst veilig te stellen mogen er geen berken worden gekapt. De draaihal leeft voornamelijk van mieren, waarvan een aantal soorten luizen melken die zich bevinden in o.a. dennen en berken. Daarnaast foerageren mieren enkel bij een grondtemperatuur onder de 35°C. Op hete dagen zijn mieren in de heide dus voor het merendeel niet meer beschikbaar voor de draaihal. Door voldoende opslag te laten staan blijven de mieren actief in de schaduw waardoor ook bij hoge temperaturen voedsel aanwezig blijft voor de draaihal en mogelijk de jongen. Ditzelfde geldt mogelijk ook voor andere vogelsoorten en de zandhagedis die van insecten leven.

Bijlage

