

2015 = 4e seizoen vogels ringen bij Batavia Kwelstrook  
10e vangdag = dinsdag 27 oktober

Weer: prachtig vangweer  
Netten open: Opzetten: 5.30 – 6.40 uur Inpakken: 12.30 uur – 13.25 uur  
Netten: 68 meter mistnet  
Geluid: mix 'herfst'-vogels: mezen = pimpel-, koolmees, koperwiek, merel, zanglijster, roodborst en ringmus  
Deelnemers: Kees  
Gehoord: baardman – in het riet  
Resultaat: **76** 'nieuwe' vogels  
**4** terugvangsten  
**11** soorten vogels

Geringd zijn:

<u>Soort</u>	<u>Nieuw</u>	<u>/ Terug (= reeds geringd, gecontroleerd)</u>
-gr bont specht:	--	
-winterkoning:	1 – ♀1kj	/ 1 – ♂>1= ♂2kj op 29-4-2014
-heggenmus:	1 – volgroeid	
-roodborst:	6 – 2x ->1; 4x 1kj	
-gekr roodstaart:	--	
-merel:	3 – 1x ♂>1; 1x ♀>1; 1x ♀1kj	
-zanglijster:	3 – 1kj	
-rietzanger:	--	
-bosrietzanger:	--	
-kleine karekiet:	--	
-braamsluiper:	--	
-grasmus:	--	
-tuinfluiter;	--	
-zwartkop:	1 – ♀1kj	
-tjiftjaf:	2 – 1kj	
-siberische tjif:	--	
-fitis:	--	
-goudhaantje:	1 – ♂>1kj	
-vuurgoudhaantje:	--	
-bonte vliegenvanger:	--	
-pimpelmees:	<b>22</b> – 3x ♂>1; 4x ♂1kj; 3x ♀1kj; 12x -1kj	Terug: 2 – ♂1kj = -1kj op 20-8-2015; ♀1kj = -1kj op 26-6-2015
-koolmees:	<b>34</b> – 7x ♀>1kj; 8x ♂1kj; 19x ♀1kj	Terug: 1 – ♂1kj = -1kj op 20-8-2015
- <b>zwarte mees</b> :	<b>2</b> – 1kj	
-boomkruiper:	--	

Daar zijn ze dan – de mezen!!! Maar liefst 22 pimpels en 34 koolmezen kregen vandaag een ring om. En slechts 2 pimpels en 1 koolmees teruggevangen, dus Ja – er is trek van mezen. Helaas was er geen mees met een 'vreemde' ring bij, niet uit Nederland en niet uit het buitenland, dus weten we niet echt waar ze vandaan komen.

Maar héél leuk: er zaten 2 zwarte mezen bij, wéér een nieuwe soort, zelfs een totaal nieuwe soort voor de Kwelstrook! In Lelystad vangen we niet veel zwarte mezen, terwijl er wel een invasie is in Nederland van deze leuke vogeltjes, maar 't is wel mooi om ze op de lijst te kunnen zetten.

De teruggevangen man winterkoning is geringd als 2 kj, dwz hij is geboren in het jaar ervoor, dus nu is hij 2 jaar oud.

Om van een pimpelmees te kunnen bepalen of het een mannetje of een vrouwtje is, wordt gekeken naar de kleur (man heeft meer blauw) en eventueel naar de vleugellengte, maar daarin zit veel overlap. En jeugdkleed – van het teruggevangen vrouwtje – wil zeggen dat ze heel gele wangen had en nog geen blauw petje toen ze werd geringd. Het verschil tussen man en vrouw koolmees zit hem in de breedte van de 'stropdas'.